

Diphtherie	alle Erwachsene	Grundimmunisierung (3x) 2. nach 4-6 Wo. 3. nach 6-12 Mon. Auffrischung alle 10 Jahre
FSME (Frühsommer- Meningitis) (=Zecken)	gefährdete Personen in Endemiegebieten	Grundimmunisierung Auffrischungsimpfungen: Intervalle unterschiedlich je nach Hersteller
Hepatitis A	bestimmte Berufs- und Risikogruppen, Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko Reisemedizin Risiko- Gebiete	Je nach Hersteller besteht schon nach einer Impfdosis ein guter Schutz gegen Hepatitis A. 2. Impfung nach 6 Mon. Schutz ca. 10 Jahre
Heatitis B	bestimmte Berufs- u. Risikogruppen und Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko	Grundimmunisierung, Auffrischung bei bestimmtem Blutwert, sonst alle 10 Jahre
Influenza (Virus- Grippe) Hauptinfektzeit: Dezember- Februar	bestimmte Berufs- u. Risikogruppen, Personen über 60 Jahre, alle Erwachsene bei Epidemien nicht bei Hühnereiweiß-allergie	Jährlich, da ständig wechselnde Viren- kombinationen , Impfung ab September eines jeden Jahres.
Pneumokokken	Personen über 60 Jahre, bestimmte Risikogruppen	Grundimmunisierung (1x) Auffrischung nur Risiko-Gruppen ca. alle 3-5 Jahre
Poliomyelitis (IPV)	alle Erwachsene	Grundimmunisierung (3 dokumentierte Impfungen) Auffrischung alle 10 Jahre
Tetanus	alle Erwachsene	Grundimmunisierung (3 dokumentierte Impfungen) Auffrischung alle 10 Jahre
Tollwut (Tierbiss oder Kontakt mit Tollwutköder)	bestimmte Berufsgruppen - nach Hundebiss und unklarem Impfzustand des Hundes	Grundimmunisierung Auffrischungsimpfung nach spez. Plan