

<b>Impfstoff / Impfstoff - kombinationen</b>	<b>mit 2 Monaten mit 3 Monaten</b>	<b>mit 4 Monaten</b>	<b>mit 11 - 14 Monaten</b>	<b>mit 5 - 6 Jahren</b>	<b>mit 9 - 17 Jahren</b>
<b>Diphtherie (D) als "d" bei Kindern ab 6 Jahre u. Erwachsene), Tetanus (T), Pertussis (aP)/ Keuchhusten,</b>	1. und 2. Impfung Abstand zwischen der 1. und 2. Impfung mindestens 4 Wochen	3. Impfung Abstand zwischen der 2. und 3. Impfung mindestens 4 Wochen	4. Impfung Abstand zwischen der 3. und 4. Impfung mindestens 6 Monate.		
<b>Pertussis (aP) Keuchhusten</b>	1. Impfung mit 2 Monaten, 2. Impfung mit 3 Monaten	3. Impfung	4. Impfung oder eine einmalige 1. Impfung falls bisher noch nicht erfolgt	Auffrischungs - impfung nur in Ausnahmefällen	Auffrischungs - impfung nur in Ausnahmefällen
<b>Haemophilus influenzae Typ b (Hib)</b>	1. Impfung im 3. Lebens- monat	2. Impfung im 5. Lebens- monat	3. Impfung		
<b>Poliomyelitis (Kinderlähmung) (IPV)  kann gleichzeitig mit vielen Routineimpf. gegeben werden  (verschiedene Körperstellen)</b>	1. Impfung	2. Impfung : nach 8 Wo. möglich, verbesserte Schutzwirkung bei Impfung nach 6 Monaten	Im Gegensatz zur Schluckimpfung werden bei der IPV-Virelon keine Viren ausgeschieden. Besteht eine unvollständige Grund- immunisierung nach Schluckimpfung, so wird diese durch IPV-Gabe auf 3 Impfungen vervollständigt.		Auffrischung mit dem 11. Lebensjahr, danach bei möglicher Exposition (Reisen, Risikopersonen) alle 10 Jahre.
<b>Hepatitis B</b>	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung		Grund - immunisierung für bisher ungeimpfte Jugendliche 2. Impfung nach 1 Monat, 3. Impfung nach 6 Monaten
<b>Masern - Mumps - Röteln (MMR)</b>			1. Impfung 2. Impfung mit 15-23 Monaten	Falls noch nicht erfolgt : 1. Impfung, die 2. Impfung kann bereits nach 4 Wochen erfolgen	eventuell 2. Impfung, falls noch nicht erfolgt oder Grund - immunisierung (1. u. 2. Impfung im Abstand von 4 Wochen)
<b>Diphtherie, Tetanus (DT/Td)</b>				Auffrischung	Auffrischung, falls noch nicht erfolgt, danach alle 10 Jahre