

IMPFUNGEN	Säuglinge			Kleinkinder			Kinder			Jugendliche			Erwachsene					
	1,5 Mo.	2 Mo.	3 Mo.	4 Mo.	5 - 10 Mo.	11 Mo. ¹	12 Mo.	13 - 14 Mo.	15 Mo.	16 - 23 Mo.	2 - 4 J.	5 - 6 J.	7 - 8 J.	9 - 14 J.	15 - 16 J.	17 J.	ab 18 J.	ab 60 J.
Rotavirus ^{*2}	G1	G2	(G3)															
Tetanus, Diphtherie		G1	N	G2 ^{*3}	N	G3 ^{*3}		N				A1	N	A2	N		A (alle 10 Jahre)	
Pertussis		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N				A1	N	A2	N		A (einmalig)	
Poliomyelitis		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N				N		A1	N			
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N										
Hepatitis B		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N				N						
Pneumokokken ^{*4}		G1	N	G2	N	G3		N									S (einmalig)	
Meningokokken B ^{*5}		G1	N	G2	N		G3	N										
Meningokokken C							G	N										
Masern, Mumps, Röteln (MMR) ^{*6}						G1	N	G2	N								S (ggf. einmalig)	
Varizellen (V)																		
HPV ^{*7} (Humane Papillomaviren)														G1 + G2	N			
COVID-19 ^{*8}																	G1 + G2 + G3	S (jährlich)
Influenza ^{*9}																		S (jährlich)
Herpes zoster ^{*10}																		G1 + G2

U Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

J Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

⌚ Schluckimpfung

L Lebendimpfung
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

G Grundimmunisierung bis zu 3 Teilimpfungen G1-G3

S Standardimpfung

A Auffrischungsimpfung

N Nachholimpfung
Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

*1 Aufteilung auf mehrere Impftermine möglich.

*2 Rotavirus: 1. Impfdosis ab dem Alter von 6 Wochen; je nach Impfstoff 2 Impfdosen (Rotarix®) bzw. 3 Impfdosen (RotaTeq®); Mindestabstand je 4 Wochen. Abschluss der Impfserie (spätestens!) bis zum Alter von ≤24 Wochen (Rotarix®) bzw. ≤32 Wochen (RotaTeq®).

*3 Sechsfach: Mindestabstand zwischen 2. und 3. (d.h. letzter) Impfdosis: 6 Monate. Frühgeborene (<37 SSW): Zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insg. 4 Impfdosen).

*4 Pneumokokken: Grundimmunisierung (bei Kindern): Mit PCV13 oder PCV15; Mindestabstand zwischen 2. und 3. (d.h. letzter) Impfdosis: 6 Monate; Frühgeborene (<37 SSW): Zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insg. 4 Impfdosen). Standardimpfung (ab 60 Jahren): Mit PCV20.

*5 Meningokokken B: Im Alter von 2-23 Monaten 3 Impfdosen, bei Nachholimpfung im Alter von ≥24 Monaten 2 Impfdosen.

*6 MMR(V): Grundimmunisierung (bei Kindern): 1. MMR-Impfdosis mit zeitgleicher Varizellen-Impfung (an anderer Körperstelle) empfohlen, 2. MMR-Impfdosis mit MMRV-Kombinationsimpfstoff möglich. Standardimpfung (Erwachsene): Einmalige MMR-Impfung nach 1970 geborener Erwachsener mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Impfung.

*7 HPV: Im Alter von 9 bis <15 Jahren 2 Impfdosen; Mindestabstand: 5 Monate. Bei einem Impfabstand <5 Monate oder Beginn der Impfserie im Alter von ≥15 Jahren: 3. Impfdosis notwendig. Komplettierung unvollständiger HPV-Grundimmunisierungen möglichst auch bei Personen ≥18 Jahre.

*8 COVID-19: Grundimmunisierung: 1-3 Impfdosen, bis die für die Basissimmunität erforderlichen ≥3 Antigenkontakte (inkl. ≥1 Impfung) erreicht sind. Mindestabstände: Zwischen 1. und 2. Impfdosis 4 Wochen (idealerweise 12 Wochen), zwischen 2. und 3. Impfdosis 6 Monate. Standardimpfung (ab 60 Jahren): Jährlich im Herbst.

*9 Influenza: Jährliche Impfung im Herbst mit Hochdosis-Impfstoff.

*10 Herpes zoster: 2 Impfdosen des Totimpfstoffs im Abstand von 2-6 Monaten.